

がん種	レジメン名	当院採用薬	用量	用法	投与日	1コース期間
大腸がん	mFOLFOX6	レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注	D 1	14日間
		オキサリプラチン	85 mg/m ²	点滴静注	D 1	
		フルオロウラシル	400 mg/m ²	急速静注	D 1	
		フルオロウラシル	2400 mg/m ²	持続静注	D 1	
	sLV5FU2	レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注	D 1	14日間
		フルオロウラシル	400 mg/m ²	急速静注	D 1	
		フルオロウラシル	2400 mg/m ²	持続静注	D 1	
	FOLFIRI	レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注	D 1	14日間
		イリノテカン	150 mg/m ²	点滴静注	D 1	
		フルオロウラシル	400 mg/m ²	急速静注	D 1	
		フルオロウラシル	2400 mg/m ²	持続静注	D 1	
	SOX	エスワン	80 mg/m ²	内服	D 1~14	21日間
		オキサリプラチン	130 mg/m ²	点滴静注	D 1	
	XELOX	セロター	2000 mg/m ²	内服	D 1~14	21日間
		オキサリプラチン	130 mg/m ²	点滴静注	D 1	
	CPT-11	イリノテカン	150 mg/m ²	点滴静注	D 1	14日間
	IRIS(CPT-11+S-1)	エスワン	80 mg/m ²	内服	D 1~14	28日間
		イリノテカン	125 mg/m ²	点滴静注	D 1,15	
	BV+mFOLFOX6	アバスチン	5 mg/kg	点滴静注	D 1	14日間
		レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注	D 1	
オキサリプラチン		85 mg/m ²	点滴静注	D 1		
フルオロウラシル		400 mg/m ²	急速静注	D 1		
フルオロウラシル		2400 mg/m ²	持続静注	D 1		
BV+FOLFIRI	アバスチン	5 mg/kg	点滴静注	D 1	14日間	
	レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注	D 1		
	イリノテカン	150 mg/m ²	点滴静注	D 1		
	フルオロウラシル	400 mg/m ²	急速静注	D 1		
	フルオロウラシル	2400 mg/m ²	持続静注	D 1		
BV+SOX	アバスチン	7.5 mg/kg	点滴静注	D 1	21日間	
	エスワン	80 mg/m ²	内服	D 1~14		
	オキサリプラチン	130 mg/m ²	点滴静注	D 1		
BV+XELOX	アバスチン	7.5 mg/kg	点滴静注	D 1	21日間	
	セロター	2000 mg/m ²	内服	D 1~14		
	オキサリプラチン	130 mg/m ²	点滴静注	D 1		
BV+Capecitabine	アバスチン	7.5 mg/kg	点滴静注	D 1	21日間	
	セロター	2000 mg/m ²	内服	D 1~14		
BV+IRIS	アバスチン	5 mg/kg	点滴静注	D 1,15	28日間	
	エスワン	80 mg/m ²	内服	D 1~14		
	イリノテカン	125 mg/m ²	点滴静注	D 1,15		
BV+FTD/TPI	アバスチン	5 mg/kg	点滴静注	D 1,15	28日間	
	ロンサーフ	70 mg/m ²	内服	D 1~5,8~12		
BV+FOLFOXIRI	アバスチン	5 mg/kg	点滴静注	D 1	14日間	
	イリノテカン	150 mg/m ²	点滴静注	D 1		

		レボ`ホリナート	200 mg/m ²	点滴静注	D 1	
		オキサリプラチン	85 mg/m ²	点滴静注	D 1	
		フルオロウラシル	2400 mg/m ²	持続静注	D 1	
	Ramucirumab + FOLFIRI	サイラムザ`	8 mg/kg	点滴静注	D 1	14日間
		レボ`ホリナート	200 mg/m ²	点滴静注	D 1	
		イリノテカン	150 mg/m ²	点滴静注	D 1	
		フルオロウラシル	400 mg/m ²	急速静注	D 1	
		フルオロウラシル	2400 mg/m ²	持続静注	D 1	
	Panitumumab+ mFOLFOX6	ベ`クティビ`ックス	6 mg/kg	点滴静注	D 1	14日間
		レボ`ホリナート	200 mg/m ²	点滴静注	D 1	
		オキサリプラチン	85 mg/m ²	点滴静注	D 1	
		フルオロウラシル	400 mg/m ²	急速静注	D 1	
		フルオロウラシル	2400 mg/m ²	持続静注	D 1	
	Panitumumab+FOLFIRI	ベ`クティビ`ックス	6 mg/kg	点滴静注	D 1	14日間
		レボ`ホリナート	200 mg/m ²	点滴静注	D 1	
		イリノテカン	150 mg/m ²	点滴静注	D 1	
		フルオロウラシル	400 mg/m ²	急速静注	D 1	
		フルオロウラシル	2400 mg/m ²	持続静注	D 1	
	Panitumumab	ベ`クティビ`ックス	6 mg/kg	点滴静注	D 1	14日間
	AfliberceptBeta + FOLFIRI	ザ`ルトラッ`プ	4 mg/kg	点滴静注	D 1	14日間
		レボ`ホリナート	200 mg/m ²	点滴静注	D 1	
		イリノテカン	150 mg/m ²	点滴静注	D 1	
		フルオロウラシル	400 mg/m ²	急速静注	D 1	
		フルオロウラシル	2400 mg/m ²	持続静注	D 1	
	BV+UFT+LV	ア`バスチン	5 mg/kg	点滴静注	D 1,15	28日間
		UFT	300 mg/m ²	内服	D 1~21	
		ホリナート	75 mg/m ²	内服	D 1~21	