

がん種	レジメン名	当院採用薬	用量	用法	投与日	1コース期間
胃がん	SP(S-1+CDDP)	エスワン	80 mg/m ²	内服	D 1~21	35日間
		シスプラチン	60 mg/m ²	点滴静注	D 8	
	XP(Cape+CDDP)	セロータ [®]	2000 mg/m ²	内服	D 1~14	21日間
		シスプラチン	80 mg/m ²	点滴静注	D 1	
	SOX(S-1+L-OHP)	エスワン	80 mg/m ²	内服	D 1~14	21日間
		オキサリプラチン	100 mg/m ²	点滴静注	D 1	
	XELOX(Cape+L-OHP)	セロータ [®]	2000 mg/m ²	内服	D 1~14	21日間
		オキサリプラチン	130 mg/m ²	点滴静注	D 1	
	S-1+Docetaxel	エスワン	80 mg/m ²	内服	D 1~14	21日間
		ドセタキセル	40 mg/m ²	点滴静注	D 1	
	Tra+SP	トラスツズマブ [®]	8→6 mg/kg	点滴静注	D 1	21日間
		エスワン	80 mg/m ²	内服	D 1~14	
		シスプラチン	60 mg/m ²	点滴静注	D 1	
	Tra-XP	トラスツズマブ [®]	8→6 mg/kg	点滴静注	D 1	21日間
		セロータ [®]	2000 mg/m ²	内服	D 1~14	
		シスプラチン	80 mg/m ²	点滴静注	D 1	
	Ramucirumab+wPTX	サイラムザ [®]	8 mg/kg	点滴静注	D 1,15	28日間
		パクリタキセル	80 mg/m ²	点滴静注	D 1,8,15	
	weekly-PTX	パクリタキセル	80 mg/m ²	点滴静注	D 1,8,15	28日間
	CPT-11	イリノテカン	150 mg/m ²	点滴静注	D 1	14日間
Tra+XELOX	トラスツズマブ [®]	8→6 mg/kg	点滴静注	D 1	21日間	
	セロータ [®]	2000 mg/m ²	内服	D 1~14		
	オキサリプラチン	130 mg/m ²	点滴静注	D 1		
Tra+SOX	トラスツズマブ [®]	8→6 mg/kg	点滴静注	D 1	21日間	
	エスワン	80 mg/m ²	内服	D 1~14		
	オキサリプラチン	130 mg/m ²	点滴静注	D 1		
Nivolumab	オプジーボ [®]	240 mg/body	点滴静注	D 1	14日間	
Tri-weekly nab-PTX	アブラキサン	260 mg/m ²	点滴静注	D 1	21日間	
mFOLFOX6	レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注	D 1	14日間	
	オキサリプラチン	85 mg/m ²	点滴静注	D 1		
	フルオウラシル	400 mg/m ²	急速静注	D 1		
	フルオウラシル	2400 mg/m ²	持続静注	D 1		